

Première reproduction naturelle de saumon atlantique dans le Haut-Rhin

Le dimanche 5 décembre 2010, un saumon atlantique mort a été retrouvé par un membre de l'association de pêche de Lapoutroie dans la Fecht à hauteur d'Ingersheim.

Il s'agit d'une femelle de 90 cm. Un prélèvement d'écaillés a été réalisé afin de déterminer son âge et de revenir à l'année d'alevinage, ainsi qu'un prélèvement de tissus afin de déterminer son origine génétique.

Son état de maigreur laissait supposer une mortalité "post-reproduction". Sur place, il a été possible de confirmer la présence d'une frayère [*]. Deux autres grands salmonidés de 70 à 80 cm ont également été aperçus à proximité.

Il s'agit à ce jour de la première reproduction naturelle du saumon atlantique mise en évidence dans le département du Haut-Rhin.



* Frayère : lieu de reproduction

Première reproduction naturelle de saumon atlantique dans le Haut-Rhin

Le dimanche 5 décembre 2010, un saumon atlantique mort a été retrouvé par un membre de l'association de pêche de Lapoutroie dans la Fecht à hauteur d'Ingersheim.

Il s'agit d'une femelle de 90 cm. Un prélèvement d'écaillés a été réalisé afin de déterminer son âge et de revenir à l'année d'alevinage, ainsi qu'un prélèvement de tissus afin de déterminer son origine génétique.

Son état de maigreur laissait supposer une mortalité "post-reproduction". Sur place, il a été possible de confirmer la présence d'une frayère [*]. Deux autres grands salmonidés de 70 à 80 cm ont également été aperçus à proximité.

Il s'agit à ce jour de la première reproduction naturelle du saumon atlantique mise en évidence dans le département du Haut-Rhin.



* Frayère : lieu de reproduction